

## プロトピック軟膏の注意点

約80%の患者に、ほてりやヒリヒリ感、かゆみといった副作用が初期にでます。これらは1週間程度で改善するので、びっくりして使用をやめないようにしてください。

### ポイント 刺激感を改善するポイント

- ① 入浴直後の塗布はさける
  - ・ 体の熱が冷めてから塗布します
- ② 保湿剤の上から塗布する
- ③ 刺激感が強ければ隔日に
  - ・ 1日おき・2日おきなど間をあける
- ④ 強い紫外線はさける
  - ・ 夏場は、帽子や日傘を使いましょう！

※ タクロリムス軟膏はジェネリック医薬品です  
効果に変わりはありません。



## プロトピック軟膏の注意点

約80%の患者に、ほてりやヒリヒリ感、かゆみといった副作用が初期にでます。これらは1週間程度で改善するので、びっくりして使用をやめないようにしてください。

### ポイント 刺激感を改善するポイント

- ① 入浴直後の塗布はさける
  - ・ 体の熱が冷めてから塗布します
- ② 保湿剤の上から塗布する
- ③ 刺激感が強ければ隔日に
  - ・ 1日おき・2日おきなど間をあける
- ④ 強い紫外線はさける
  - ・ 夏場は、帽子や日傘を使いましょう！

※ タクロリムス軟膏はジェネリック医薬品です  
効果に変わりはありません。

