

SGLT2 阻害薬の注意点

今回、服用する

_____ というお薬は

腎臓における糖分の再取り込みを抑えて、
尿から糖分を排出していくお薬です。

ポイント

- ① 脱水症状に気をつける
 - ・ 毎食後にコップ 1 杯のお水を飲むこと
- ② 尿路感染症に注意する
 - ・ トイレは我慢しないこと
- ③ シックデイのときは薬を飲まない
 - ・ 発熱・下痢・嘔吐・食欲不振のときは飲まないこと
- ④ 食事療法は続けること
 - ・ 過度な糖質制限はしないように



©薬わかるー指導せんー

SGLT2 阻害薬の注意点

今回、服用する

_____ というお薬は

腎臓における糖分の再取り込みを抑えて、
尿から糖分を排出していくお薬です。

ポイント

- ① 脱水症状に気をつける
 - ・ 毎食後にコップ 1 杯のお水を飲むこと
- ② 尿路感染症に注意する
 - ・ トイレは我慢しないこと
- ③ シックデイのときは薬を飲まない
 - ・ 発熱・下痢・嘔吐・食欲不振のときは飲まないこと
- ④ 食事療法は続けること
 - ・ 過度な糖質制限はしないように



©薬わかるー指導せんー