

2種類以上の坐薬の使い方

水溶性基剤の坐薬：

ダイアップ・ナウゼリン・エスクリなど

油脂性基剤の坐薬：

アンヒバ・アルピニー・新レシカルボン・セニラン・
ボルタレンサポ・アンパック・テレミンソフトなど



□ 同じ基剤の坐薬を同時に使うとき

- ① 緊急性のある坐薬から先に入れる
- ② 5分以上あけて、次の坐薬を入れる

□ 違う基剤の坐薬を同時に使うとき

順番 →

- ① 水溶性の坐薬から先に入れる
- ② 30分以上あけて、油脂性の坐薬を入れる
- ③ 順番を逆にしたときは、1時間半以上あける



坐薬の先端を少し温める、水やサラダ油
で少しぬらしてから使うと入りやすい

© 薬わかる—指導せん—

2種類以上の坐薬の使い方

水溶性基剤の坐薬：

ダイアップ・ナウゼリン・エスクリなど

油脂性基剤の坐薬：

アンヒバ・アルピニー・新レシカルボン・セニラン・
ボルタレンサポ・アンパック・テレミンソフトなど



□ 同じ基剤の坐薬を同時に使うとき

- ① 緊急性のある坐薬から先に入れる
- ② 5分以上あけて、次の坐薬を入れる

□ 違う基剤の坐薬を同時に使うとき

順番 →

- ① 水溶性の坐薬から先に入れる
- ② 30分以上あけて、油脂性の坐薬を入れる
- ③ 順番を逆にしたときは、1時間半以上あける



坐薬の先端を少し温める、水やサラダ油
で少しぬらしてから使うと入りやすい

© 薬わかる—指導せん—